Ergotamina en asociación/ (cafeína/ paracetamol), comprimido recubierto 1 mg/ (100 mg/ 300mg), vía oral, código IGSS: 954

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento agudo de las crisis de migraña, equivalentes migrañoides y cefaleas vasomotoras.

Reacciones adversas: mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, parestesias, hipoestesias, cianosis, vasoconstricción periférica, diarrea, debilidad de una extremidad dolor de extremidades.

Precauciones de uso: Ergotamina puede provocar isquemia miocárdica o en casos raros, infarto, debido a sus propiedades vasoconstrictoras, incluso en pacientes sin historia previa conocida de enfermedades coronarias con dosis elevadas puede producirse vasoespasmo y con el uso continuado cambios fibróticos, en particular de la pleura y del retroperitoneo y más raramente de las válvulas cardiacas.
Si aparecen síntomas sugerentes de vasoespasmo (parestesia en dedos de manos y pies, cefaleas o síntomas de isquemia miocárdica, debe interrumpirse el tratamiento inmediatamente y consultar al médico.
El uso prolongado de cualquier tipo de analgésicos para el tratamiento de las cefaleas puede empeorar esta situación clínica
Contiene cafeína que puede producir un resultado positivo en las pruebas de control de dopaje.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos de este medicamento o a alguno de los excipientes.
Trastornos circulatorios periféricos. Enfermedad vascular obliterante. Cardiopatía isquémica. Hipertensión. Sepsis. Insuficiencia renal. Enfermedades hepáticas. Arteritis temporal.
Migraña hemipléjica o basilar
Tratamiento concomitante con otros medicamentos que se metabolizan por el CYP 3A4.
Tratamiento concomitante con agentes vasoconstrictores.
Tratamiento concomitante con antibióticos macrólidos, antiretrovirales inhibidores de la proteasa o de la transcriptasa inversa, antifúngicos azólicos.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.