Albendazol, tableta o tableta masticable, 200 mg, vía oral, código IGSS: 120

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la neurocisticercosis parenquimatosa debida a lesiones activas causadas por formas larvarias de la tenia del cerdo, taenia solium. Tratamiento de la hidatidosis quística del hígado, pulmón y peritoneo, causada por la forma larvaria de la tenia del perro, Echinococcus granulosus.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, neurocisticercosis, enfermedad hidatídica, función hepática anormal, enfermedad hidatídica, neurocisticercosis, abdominal, enfermedad hidatídica, náuseas vómitos, enfermedad hidatídica, neurocisticercosis, mareos/vértigo, enfermedad hidatídica, neurocisticercosis, aumento de la presión intracraneal, neurocisticercosis, signos meníngeos, neurocisticercosis, alopecia (reversible), enfermedad hidatídica, neurocisticercosis, fiebre, enfermedad hidatídica, erupción, urticaria, agranulocitosis, anemia aplásica, supresión de la médula ósea, granulocitopenia, pancitopenia, trombocitopenia, hepatitis, insuficiencia hepática aguda, fallo renal agudo.

Precauciones de uso: Se han informado muertes debido a la supresión de la médula ósea; controle los recuentos sanguíneos en todos los pacientes al comienzo de cada ciclo de terapia de 28 días y cada 2 semanas durante la terapia. Suspender albendazol si se producen cambios clínicamente significativos en los recuentos sanguíneos. Puede causar Toxicidad embriofetal. Se recomienda la prueba de embarazo para las mujeres con potencial reproductivo antes de la terapia. Informar a las mujeres sobre el potencial reproductivo del riesgo potencial para el feto y utilizar un método anticonceptivo eficaz. Los pacientes con neurocisticercosis pueden

experimentar episodios de hipertensión cerebral, convulsiones o déficits neurológicos focales después del inicio de la terapia; comenzar la terapia adecuada con esteroides y anticonvulsivantes.

Se han informado casos de compromiso retinal; examinar al paciente para detectar la presencia de lesiones en la retina antes de iniciar el tratamiento de la neurocisticercosis.

Efectos hepáticos. Pueden ocurrir elevaciones de las enzimas hepáticas. Controle las enzimas hepáticas antes del inicio de cada ciclo de tratamiento y al menos cada 2 semanas mientras recibe tratamiento con albendazol y suspender si se producen elevaciones clínicamente significativas.

Anticoncepción:

Mujeres: Puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada; aconsejar a las mujeres con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante los 3 días posteriores a la dosis final.

Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad conocida a la clase de compuestos de bencimidazol o cualquier componente de albendazol.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.