Clorfeniramina maleato, tableta, 4 mg, vía oral, código IGSS: 1119

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio de los síntomas de afecciones alérgicas: fiebre del heno (rinitis alérgica estacional), urticaria, prurito, alergia alimentaria, reacciones a fármacos y sueros, reacciones a mordeduras o picaduras de insectos, alergias a alimentos o medicamentos y edema angioneurótico.

Reacciones adversas: Depresión del sistema nervioso central, somnolencia, sedación que varía de somnolencia leve a sueño profundo (más frecuente), mareo, languidez, coordinación alterada, debilidad muscular, inquietud, insomnio, temblores, euforia, nerviosismo, delirio, palpitaciones, convulsiones (menos frecuente).
Malestar epigástrico, anorexia, nausea, vómitos, diarrea, estreñimiento, colestasis, hepatitis, insuficiencia hepática, anomalía de la función hepática, ictericia es raro, taquicardia, palpitaciones cambios en el ECG (ej. QRS ensanchado), arritmia (ej. Extrasístole, bloqueo cardíaco), hipotensión, hipertensión. Pueden producirse mareos, sedación e hipotensión en pacientes geriátricos.
Sequedad de boca, nariz y garganta. Disuria, retención urinaria, importancia, vértigo, trastornos visuales, visión borrosa, diplopía (acúfenos), laberintitis aguda, irritabilidad, discinesia facial, opresión en el pecho, espesamiento de las secreciones bronquiales, sibilancia, congestión nasal, sudoración, escalofríos, menstruación precoz, psicosis tóxica, dolor de cabeza, desmayo, parestesia, agranulocitosis, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia.

Frecuencia no definida:

Depresión del sistema nervioso central, somnolencia, sedación que varía de somnolencia leve a sueño profundo (más frecuente), mareo, languidez, coordinación alterada, debilidad muscular, inquietud, insomnio, temblores, euforia, nerviosismo, delirio, palpitaciones, convulsiones (menos frecuente).

Malestar epigástrico, anorexia, nausea, vómitos, diarrea, estreñimiento, colestasis, hepatitis, insuficiencia hepática, anomalía de la función hepática, ictericia es raro, taquicardia, palpitaciones cambios en el ECG (ej. QRS ensanchado), arritmia (ej. Extrasístole, bloqueo cardíaco), hipotensión, hipertensión. Pueden producirse mareos, sedación e hipotensión en pacientes geriátricos.

Sequedad de boca, nariz y garganta. Disuria, retención urinaria, importancia, vértigo, trastornos visuales, visión borrosa, diplopía (acúfenos), laberintitis aguda, irritabilidad, discinesia facial, opresión en el pecho, espesamiento de las secreciones bronquiales, sibilancia, congestión nasal, sudoración, escalofríos, menstruación precoz, psicosis tóxica, dolor de cabeza, desmayo, parestesia, agranulocitosis, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia.

Precauciones de uso: Se debe administrar la clorfeniramina con precaución en pacientes con epilepsia, presión intraocular elevada, incluyendo glaucoma, hipertrofia prostática; hipertensión grave o enfermedad cardiovascular, tirotoxicosis, retención urinaria, bronquitis, bronquiectasis o asma e insuficiencia hepática.

Los niños y los adultos de edad avanzada son más susceptibles de experimentar los efectos anticolinérgicos neurológicos y la excitación paradójica como aumento de energía, inquietud y nerviosismo.

No se utiliza simultáneamente junto con el alcohol, porque aumenta los efectos del alcohol. No se debe utilizar con otros productos que contengan antihistamínicos, incluidos los de la tos y el resfriado.

No se administra este medicamento a pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o mala absorción de glucosa-galactosa.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento. Hipersensibilidad a antihistamínicos. Pacientes con enfermedades de las vías respiratorias bajas, por ejemplo, asma (controversial). Pacientes en coma o pacientes con daño cerebral. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa en los últimos 14 días. No se debe administrar a pacientes prematuros y neonatos, mujeres lactantes.
No se administra en pacientes con asma agudo y apnea del sueño.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.