Entacapona, tableta, 200 mg, vía oral, código IGSS:850

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Complemento de la levodopa y la carbidopa para tratar el "desaparecimiento" del final de la dosis en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Reacciones adversas: Discinesia, náuseas, diarrea, hipercinesia, decoloración de la orina, hipocinesia, mareos, dolor abdominal, fatiga, estreñimiento, dolor de espalda, vómitos, boca seca, disnea, aumento de la sudoración, dolor de espalda, ansiedad, somnolencia, dispepsia, flatulencia, púrpura, astenia, alucinaciones, perversión del gusto, agitación, gastritis, infección bacteriana.

Precauciones de uso: No debe ser coadministrado con catecolaminas.
Posible somnolencia.
Terapia dopaminérgica ha sido asociada a hipotensión ortostática, alucinaciones, melanoma, y puede causar o exacerbar discinesia, rabdomiólisis, hiperpirexia y confusión.
Puede experimentar impulsos intensos de apostar, aumento de los impulsos sexuales, impulsos intensos de gastar dinero sin control y otros impulsos intensos.
Diarrea.
Se ha informado fibrosis retroperitoneal, infiltrados pulmonares, derrame pleural y engrosamiento pleural en algunos pacientes.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.