Esomeprazol, Granulado, mirogránulos o gránulos/ entéricos o gastrorresistentes para suspensión oral, 10 mg, sobre, vía oral, código IGSS: 100195

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Niños de 1 a 11 años
Enfermedad por reflujo gastroesofágico:
Tratamiento de la esofagitis erosiva por reflujo confirmada mediante endoscopia.
Tratamiento sintomático de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, flatulencia, indigestión, náuseas, dolor abdominal, diarrea, xerostomía, mareos, estreñimiento, somnolencia, prurito agranulocitosis, pancitopenia, visión borrosa, pancreatitis, estomatitis, colitis microscópica, insuficiencia hepática, hepatitis con o sin ictericia, reacción/shock anafiláctico, candidiasis gastrointestinal hipomagnesemia, debilidad muscular, mialgia, fractura ósea, encefalopatía hepática, alteración del gusto, agresión, agitación, depresión, alucinaciones, nefritis intersticial, ginecomastia, broncoespasmo, alopecia, eritema multiforme, hiperhidrosis, fotosensibilidad, síndrome de stevens-johnson, necrólisis epidérmica tóxica (a veces mortal).

Precauciones de uso: En presencia de cualquier síntoma de alarma (pérdida de peso involuntaria y significativa,
vómitos recurrentes, disfagia, hematemesis o melena) y ante la sospecha o presencia de úlcera gástrica,deberá descartarse la posibilidad de un proceso

maligno, ya que el tratamiento con esomeprazol puede aliviar los síntomas y retrasar su diagnóstico.
Puede reducir la absorción de vitamina B12 (cianocobalamina) debido a hipoclorhidria o aclorhidria.
En el tratamiento a largo plazo, esto debe tenerse en cuenta en pacientes con reservas corporales reducidas o con factores de riesgo de absorción reducida de vitamina B12.

Se han notificado casos de hipomagnesemia grave en pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones (IBP) durante al menos tres meses, y en la mayoría de los casos durante un año.
Los inhibidores de la bomba de protones, sobre todo si se usan en dosis altas y durante largos períodos de tiempo (> 1 año), podrían elevar ligeramente el riesgo de fractura de cadera, muñeca y columna, sobre todo en personas de edad avanzada o en presencia de otros factores reconocidos de riesgo.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al esomeprazol u otros inhibidores de la bomba de protones.
Esomeprazol no debe utilizarse de forma concomitante con nelfinavir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.