Haloperidol, tableta de 5 mg, Vía oral, código IGSS: 815

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de síntomas en esquizofrenia y prevención de recaídas, otras psicosis (especialmente la paranoide).
Manía e hipomanía.
Agresión, hiperactividad y automutilación en pacientes con retraso mental o daño orgánico cerebral.
Tratamiento adjunto a corto plazo de la agitación psicomotora moderada a severa asociada con comportamiento impulsivo o peligroso.
Náuseas y vómitos.

Reacciones adversas: Síntomas extrapiramidales, acatisia, distonía, rigidez muscular, síndrome neuroléptico maligno (poco frecuente pero grave), parkinsonismo, discinesia tardía, efectos anticolinérgicos, sedación, aumento de peso, disfunción eréctil, oligomenorrea o amenorrea, hipotensión ortostática (después de inyección intramuscular), taquicardia, agitación, ansiedad, edema cerebral, depresión, mareos, euforia, dolor de cabeza, insomnio, poiquilotermia, inquietud, debilidad, confusión. anorexia, estreñimiento, dispepsia, íleo, disminución del reflejo nauseoso, opacidades del cristalino (uso prolongado), cambios de electrocardiograma, fotosensibilidad, prurito, diarrea, discrasia sanguínea, trastorno eyaculatorio, galactorrea, convulsión, ictericia colestásica, priapismo.

Precauciones de uso: Este medicamento puede interferir con actividades que requieran atención continua como manejar u operar maquinarias.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada.
Depresión tóxica grave del sistema nervioso central o estados comatosos por cualquier causa.
Enfermedad de Parkinson.
Demencia con cuerpos de Lewy.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.