Hierro aminoquelado + ácido fólico, jarabe 30 mg + 250-300 mcg/ 5 ml, frasco, 100 ml - 150 ml, vía oral, código IGSS: 598

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Esta indicado en la profilaxis y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro y ácido fólico en infantes, niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y ancianos.

Reacciones adversas: Las dosis terapéuticas de hierro pueden causar malestar gastrointestinal, constipación, diarrea y vómitos.
No se han encontrado efectos secundarios con el ácido fólico.

Precauciones de uso: Dada su alta biodisponibilidad se utiliza con mucha rapidez, por esta razón, una vez alcanzados niveles de ferritina sérica de 20 µg/L o más, se recomienda continuar el tratamiento solo con dosis de mantenimiento 1 gota/kg/día.
El hierro aminoquelado no mancha los dientes, pero si esto sucediera basta con una buena higiene dental.
La administración de hierro por más de 6 meses se debe evitar, excepto en pacientes con sangrado continuo, menorragia o embarazos repetidos. Una ingesta masiva de este producto puede resultar en intoxicación peligrosa, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
No debe administrarse junto con tiroxina y metildopa ya que el hierro disminuye la absorción de estos.

Contraindicaciones: En casos de anemia perniciosa, en casos raros de hipersensibilidad al ácido fólico, en casos de hipersensibilidad al hierro. El hierro aminoquelado debe emplearse con precaución y no debe emplearse combinado con tratamientos con hierro parenteral. También está contraindicado en casos de úlcera duodenal, carcinoma del estómago, o colitis ulcerosa. En anemia perniciosa. Evitar una sobredosis por peligro de intoxicación aguda del hierro.
Los preparados a base de hierro no deben administrarse a pacientes que reciben transfusiones repetidas de sangre o a pacientes con anemias que no se deban a una deficiencia de hierro a menos que también este presenta una ferropenia. Se requiere precaución en pacientes con enfermedades de almacenamiento de hierro.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.