Paracetamol (acetaminofén), solución oral 100 mg/ml, frasco con gotero 10 ml- 20 ml, via oral, código IGSS: 932

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada y estados febriles. Este medicamento está indicado en niños de 0 a 10 años (hasta 32 kg).

Reacciones adversas: Angioedema, desorientación, mareo, erupción maculopapular pruriginosa, erupción, hiperamonemia, síndrome de stevens-johnson, necrólisis epidérmica toxica, urticaria, hemorragia gastrointestinal, edema laríngeo, agranulocitosis, leucopenia, neutropenia, pancitopenia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, hepatotoxicidad, insuficiencia hepática, nefrotoxicidad, neumonitis, anafilactoide.

Precauciones de uso: Se debe administrar el paracetamol con precaución, evitando tratamientos prolongados en pacientes con anemia, afecciones cardíacas o pulmonares o con disfunción renal grave (en este último caso, el uso ocasional es aceptable, pero la administración prolongada de dosis elevadas puede aumentar el riesgo de aparición de efectos renales adversos).
En caso de insuficiencia renal grave, (aclaración de la creatinina inferior a 10 ml/min), el intervalo entre 2 tomas será como mínimo de 8 horas.
La utilización de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas al día) puede provocar daño hepático. En alcohólicos crónicos no se debe administrar más de 2 g/día de paracetamol

Se recomienda precaución si se administra paracetamol concomitantemente con flucloxacilina debido al aumento del riesgo de acidosis metabólica con alto desequilibrio aniónico, particularmente en pacientes con insuficiencia renal grave, sepsis, desnutrición y otras fuentes de deficiencia de glutatión (por ejemplo, alcoholismo crónico), así como aquellos que utilizan dosis máximas diarias de paracetamol. Se recomienda una estrecha vigilancia, incluida la medición de 5-oxoprolina en orina.
Debe advertirse al paciente que evite el uso simultáneo de este medicamento con otros que contengan paracetamol.
Puede alterar valores de transaminasas, meta adrenalina y ácido úrico, pruebas de función pancreática y determinaciones del ácido 5- hidroxiindolacetico.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento. Pacientes con enfermedades hepáticas (con insuficiencia hepática o sin ella) o hepatitis viral (aumenta el riesgo de hepatotoxicidad).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.