Salbutamol, suspensión en aerosol 90 mcg – 100 mcg por aspersión, envase aspersor, 200 a 250 dosis, Vía inhalación, código IGSS: 505

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento sintomático del broncoespasmo en el asma bronquial y en otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias.
Profilaxis del broncoespasmo inducido por ejercicio físico o antes de exponerse a un estímulo alergénico conocido e inevitable.

Reacciones adversas: Tremor, nerviosismo en niños de 2 a 6 años, insomnio en niños de 6 a 12 años.
Nausea, fiebre, broncoespasmo, vómitos, cefalea, mareo, tos, reacciones alérgicas, otitis media, epistaxis, aumento del apetito, infección del tracto urinario, boca seca, eructos o flatulencia, aumento de la sudoración, dolor, dispepsia, hiperactividad, escalofríos, linfadenopatia, prurito ocular, sudoración, conjuntivitis en niños de 2 a 6 años, disfonía, síndrome pseudogripal, nerviosismo.
Dolor epigástrico, epistaxis, hiperactividad en niños.
Frecuentemente no definidos:
Hipertensión, angina, vértigo, estimulación del sistema nervioso, insomnio, cefalea, acidosis metabólica, irritación de la orofaringe, hipersensibilidad, hipocalemia, aumento de los niveles de glucosa, prolongación del intervalo QT, taquicardia, urticaria, angioedema.

Precauciones de uso: El uso excesivo de agonistas beta de acción corta puede enmascarar la progresión de la enfermedad.
Se han reportado reacciones de hipersensibilidad inmediatas después de la administración.
Puede ocurrir broncoespasmo paradójico.
La necesidad progresiva de más dosis puede indicar un empeoramiento del asma y necesita re evaluación del tratamiento.
Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, glaucoma, diabetes, hipocalemia, hipertiroidismo o convulsiones.
Puede exacerbar la falla cardiaca en pacientes con reducción de la fracción de eyección.
El uso de salbutamol como monoterapia no está indicado como tratamiento para el asma, se debe considerar adicionar un agente antiinflamatorio.
No se debe utilizar otros broncodilatadores de acción corta de manera concomitante con el albuterol.
El uso concomitante con diuréticos de asa o tiazídicos puede resultar en cambios electrocardiográficos y/o hipocalemia.
El uso de salbutamol puede causar efectos cardiovasculares.
El uso de este medicamento puede producir una prueba positiva en las pruebas de dopaje deportivas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.