Sumatriptan, tableta, 100 mg, vía oral, código IGSS: 959

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento agudo de la migraña con o sin aura en adultos.

Reacciones adversas: Reacción en el lugar de la inyección, Parestesia, Mareos, Sensación de calor/calor, Malestar/presión/opresión en el pecho, Opresión en la mandíbula o el cuello, Diaforesis, Sensación de ardor, Sensación de frío, Disfagia, Dolor de garganta, Malestar, Malestar abdominal.

Precauciones de uso: Antes de tratar los dolores de cabeza en pacientes a los que no se les ha diagnosticado previamente migraña o cefalea en racimos o en pacientes que presentan síntomas atípicos, se deben excluir otras afecciones neurológicas potencialmente graves.
Igual de eficaz en cualquier etapa de la migraña, aunque se recomienda su uso temprano.
El uso excesivo de fármacos para la migraña aguda (p. ej., ergotamina, triptanos, opioides o una combinación de estos fármacos durante ≥10 días/mes) puede provocar una exacerbación del dolor de cabeza (cefalea por uso excesivo de medicamentos); la desintoxicación puede ser necesaria.
Se une a la melanina y puede causar toxicidad en los tejidos ricos en melanina si se usa durante mucho tiempo.
Informes muy raros de ceguera transitoria y permanente y pérdida parcial significativa de la visión.
Puede ocurrir síndrome serotoninérgico, particularmente durante el uso combinado con ISRS (p. ej., fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram,

escitalopram) o IRSN (p. ej., venlafaxina, duloxetina); suspender el tratamiento si ocurre.

Se informaron hemorragia cerebral/subaracnoidea y accidente cerebrovascular con la administración de agonistas 5-HT1; suspender si ocurre.

Se informó una elevación significativa de la presión arterial, incluida una crisis hipertensiva.

No apto para administración a pacientes con factores de riesgo de enfermedad de las arterias coronarias.

Tenga precaución en pacientes con antecedentes de trastorno convulsivo o umbral convulsivo reducido.

Puede causar depresión, incluidos mareos, debilidad o somnolencia (poco frecuente); precaución al operar maquinaria pesada.

Vasoespasmo de la arteria coronaria, isquemia transitoria, taquicardia/fibrilación ventricular, infarto de miocardio, paro cardíaco y muerte notificados con el uso de agonistas 5HT1; realizar evaluación cardíaca en pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular; evaluar la enfermedad de las arterias coronarias en pacientes de alto riesgo; suspender el tratamiento si se produce arritmia

Utilice las formulaciones orales con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada si el tratamiento es necesario y aconsejable; el aclaramiento presistémico, cuando se administra por vía oral, se reduce en la insuficiencia hepática y provoca un aumento de las concentraciones plasmáticas; se recomienda reducción de dosis; cuando se administra por vía parenteral (SC, intranasal), no sufre metabolismo de primer paso y puede no causar un aumento en las concentraciones plasmáticas.

Se informaron reacciones de hipersensibilidad, incluidos angioedema y anafilaxia;

El protector de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural seco (un derivado del látex) que puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles al látex.

Contraindicaciones: Actual/antecedentes de síndromes isquémicos cardíacos, cerebrovasculares o vasculares periféricos (angina, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad isquémica intestinal).
Antecedentes de accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio o migraña hemipléjica o basilar.
Antecedentes de enfermedad de las arterias coronarias o vasoespasmo de las arterias coronarias.
Síndrome de Wolff-Parkinson-White u otros trastornos de la vía de conducción accesoria cardíaca.
Hipertensión no controlada

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.