Tizanidina, tableta, 4 mg, vía oral, código IGSS: 888

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de espasmos musculares y dolor muscular. Espasticidad debido a trastornos neurológicos.

Reacciones adversas: Boca seca, somnolencia, mareo, astenia, visión borrosa, constipación, infección, alteración de las funciones renales, alteraciones del habla, vómitos, aumento de la frecuencia urinaria, infección del trato urinario, astenia, bradicardia, hipotensión, hipotensión ortostática, sincope.

Precauciones de uso: Se debe utilizar con precaución en personas con falla renal y/o hepática.
Reduce los niveles de la CYP1A2.
Puede causar efectos de rebote como hipertensión taquicardia e hipertonía luego de la discontinuación abrupta. Descontinuar la dosis de forma gradual especialmente en pacientes que consumen narcóticos o dosis altas (20-28mg/día)
Puede ocurrir hipotensión se debe utilizar con precaución en pacientes que utilizan medicamentos antihipertensivos.
Se ha asociado un riesgo de daño hepático con dosis de hasta 12mg, se recomienda realizar pruebas de función hepática durante los 4 primeros meses de tratamiento en pacientes que reciben dosis de 12 mg o más.
Se debe administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal, se recomienda utilizar como dosis inicial de 2mg al día y ajustar según la respuesta clínica.

Puede causar reacciones de hipersensibilidad incluyendo anafilaxis. Se debe vigilar al paciente los primeros dos días de administración.
Pueden existir alucinaciones visuales en el 3% de los pacientes y sedación hasta en el 50%. Se debe informar a los pacientes sobre estos efectos ya que puede interferir con las actividades normales de los pacientes.
El aclaramiento de la tizanidina se reduce en pacientes que consumen anticonceptivos por lo que se debe utilizar con precaución.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Trastornos graves en la función hepática. Administración concomitante de tizanidina o fuertes inhibidores de CYP1A2.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.