Tobramicina, ungüento oftálmico 0.3%, tubo 3.5 g. vía tópico ocular, código IGSS: 136

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de enfermedades externas. Infecciones del ojo y sus anexos causadas por bacterias susceptibles.

Reacciones adversas: Se han reportado con frecuencia no definida: toxicidad ocular localizada e hipersensibilidad, incluyendo aumento del lagrimeo, picazón, edema del párpado y eritema conjuntival (<3%). Como reacción de sensibilidad se reportó queratitis puntiforme.

Precauciones de uso: Puede ocurrir hipersensibilidad desde efectos locales hasta reacciones generalizadas.
Sobrecrecimiento de organismos no susceptibles.
No utilizar lentes de contacto si presenta signos o síntomas de infección ocular.
No topar el aplicador a la mucosa ocular o cualquier superficie debido a posible contaminación.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, aminoglucósidos o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.