Trimetazidina, tableta de liberación modificada, 35 mg, vía oral, código IGSS 1126

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Terapia adicional para el tratamiento sintomático de pacientes con angina de pecho estable que no están adecuadamente controlados o no toleran terapias antianginosas de primera línea en adultos.

Reacciones adversas: Astenia, mareos, cefaleas, dolor abdominal, diarrea, dispepsia, náuseas y vómitos.

Precauciones de uso: La aparición de alteraciones del movimiento tales como síntomas parkinsonianos, síndrome de piernas inquietas, temblores, inestabilidad de la marcha, debe llevar a la retirada definitiva de trimetazidina.
No es un tratamiento curativo de la angina de pecho. Tampoco está indicado como tratamiento inicial de la angina inestable o del infarto de miocardio, ni en el período prehospitalario, ni durante los primeros días de hospitalización.
Pueden producirse caídas, relacionadas con la inestabilidad de la marcha o la hipotensión, en particular en pacientes que estén tomando antihipertensivos.
Se debe tener precaución al prescribir trimetazidina a pacientes en los que se espera una mayor exposición:
Insuficiencia renal moderada.
Pacientes de edad avanzada mayores de 75 años.
Este medicamento está generalmente desaconsejado durante la lactancia.
Evaluar beneficio del tratamiento tes meses después del inicio, de no obtener respuesta, suspender el tratamiento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Enfermedad de parkinson, síntomas parkinsonianos, temblores, síndrome de piernas inquietas, y otros trastornos relacionados al movimiento.
Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.