Vitamina C (ácido ascórbico), tableta masticable o cápsula de 500 mg, Vía oral, código IGSS: 424

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Terapia y/o prevención de los estados de deficiencia de ácido ascórbico (escorbuto).

Reacciones adversas: Enrojecimiento, Dolor de costado, Desmayo, dolor de cabeza, Diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos, Hiperoxaluria (grandes dosis).

Precauciones de uso: Interrumpir el tratamiento si se sospecha hemólisis. Puede interferir con las pruebas de laboratorio basadas en reacciones de oxidación-reducción (Ejemplo: pruebas de glucosa en sangre y orina, niveles de nitrito y bilirrubina y recuento de leucocitos). Monitorizar la función renal; interrumpir el tratamiento si se desarrolla nefropatía por oxalato y tratar adecuadamente cualquier sospecha de nefropatía por oxalato.
Puede acidificar la orina.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.