Indapamida, tableta de liberación prolongada, 1.5 mg, vía oral, código IGSS: 739

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Hipertensión esencial en adultos.

Reacciones adversas: Hipotensión, palpación, enrojecimiento, mareo, aturdimiento, vértigo, dolor de cabeza, debilidad, inquietud, somnolencia, fatiga, letargo, malestar, anorexia, náuseas vómitos, nicturia, poliuria, visión borrosa, rinorrea, anomalías electrolíticas, prurito, erupción, vasculitis cutánea, glucosuria, pancreatitis.

Precauciones de uso: Medicamentos con sulfonamida o medicamentos derivados de sulfonamida pueden causar una reacción idiosincrásica que dé lugar a un derrame coroideo con defecto del campo visual, miopía transitoria o glaucoma agudo de ángulo cerrado. Los síntomas incluyen comienzo agudo de disminución de agudeza visual o dolor ocular y normalmente suelen ocurrir desde unas horas a unas semanas tras el comienzo del tratamiento.
En los casos de deterioro de la función hepática, los diuréticos tiazídicos pueden causar, especialmente en caso de desequilibrio electrolítico, encefalopatía hepática que puede progresar a coma hepático.
Reacciones de fotosensibilidad en relación con las tiazidas y los diuréticos tiazídicos.
Monitorear natremia, potasemia, magnesio y calcio plasmatico, glucosa sanguínea y ácido úrico.
La tiazida y los diuréticos relacionados solo son completamente eficaces cuando la función renal es normal o está mínimamente deteriorada.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a indapamida o sulfonamidas Anuria.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.