Latanoprost, solución oftálmica, 50 mcg/ ml, frasco gotero, 2.5 ml, Vía tópico ocular, código IGSS: 1226

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Reducción de la presión intraocular elevada en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular.

Reacciones adversas: Aumento de la pigmentación marrón del iris, visión borrosa, ardor y escozor, sensación de cuerpo extraño, prurito, queratopatía epitelial puntiforme, hiperemia conjuntival, infección del tracto respiratorio superior/resfriado/gripe, ojo seco, lagrimeo excesivo, dolor ocular, costra en la tapa, edema palpebral, eritema palpebral, malestar/dolor en los párpados, fotofobia, dolor torácico/angina de pecho, dolor muscular/articular/espalda, erupción cutánea/reacciones alérgicas de la piel, conjuntivitis, diplopía, secreción del ojo.

Precauciones de uso: El uso excesivo puede causar elevaciones paradójicas de la presión intraocular la cual inicia la reducción en 3 a 4 horas después de la administración y alcanza su efecto máximo a las 8 a 12 horas.
Pueden ocurrir pigmentación del iris y tejido periorbitario (párpado) y pestañas. Es probable que la pigmentación del iris sea permanente.
Cambio gradual en las pestañas, incluyendo aumento de longitud, grosor y número de pestañas. Generalmente reversible.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al latanoprost, cloruro de benzalconio u otros componentes del producto.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.