Tamoxifeno citrato, tableta, 20 mg, vía oral, código IGSS: 699

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento del cáncer de mama.

Reacciones adversas: Sofocos, flujo vaginal, amenorrea, cambios menstruales, oligomenorrea, cataratas, dolor de huesos, náuseas, tos, edema, fatiga, dolor musculoesquelético, quiste de ovario, depresión, calambres abdominales, anorexia, angioedema, cambios corneales, pérdida de libido, cáncer endometrial, pancreatitis, trombosis venosa retinal, ataque, fibras uterinas.

Precauciones de uso: Mayor incidencia de cáncer de endometrio y sarcoma uterino (principalmente tumores Müllerianos mixtos malignos) en tratamiento asociado con tamoxifeno.
Irregularidades menstruales:
Utilizar métodos de barrera u otros métodos anticonceptivos no hormonales, si son potencialmente fértiles. informar a las mujeres de los riesgos potenciales para el feto, si se quedaran embarazadas mientras se les administra tamoxifeno o en un período de dos meses desde la suspensión del tratamiento.
En estudios clínicos se ha comunicado un número de segundos tumores primarios en zonas diferentes al endometrio y la mama, después del tratamiento con tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama.
Monitorear signos y síntomas clínicos para detectar posibles reacciones adversas cutáneas graves, incluido el síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, que pueden poner en peligro la vida o ser mortales.
En administración concomitante con anticoagulantes tipo cumarínicos puede presentarse un aumento del efecto anticoagulante, vigilar.

Valorar los antecedentes familiares y factores de riesgo de trombosis que presenta la paciente. En pacientes con un mayor riesgo protrombótico se deberá valorar la pertinencia de instaurar tratamiento anticoagulante profiláctico que estaría siempre justificado en caso de cirugía e inmovilidad prolongada.

La administración concomitante de medicamentos que inhiben el CYP2D6 puede reducir las concentraciones del metabolito activo endoxifeno.

Por lo tanto, los inhibidores potentes del CYP2D6 (por ejemplo, paroxetina, fluoxetina, quinidina, cinacalcet o bupropion) deben evitarse durante el tratamiento con tamoxifeno, siempre que sea posible.

Anticoncepción:

Mujeres: Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos no hormonales efectivos durante el tratamiento y durante los 2 meses posteriores a la última dosis.

Esterilidad:

Según estudios en animales, el tamoxifeno puede afectar la implantación de embriones en mujeres con potencial reproductivo; sin embargo, es posible que no cause infertilidad de manera confiable.

Aconseje a las mujeres que el tamoxifeno no siempre causa infertilidad, incluso en presencia de irregularidades menstruales.

Contraindicaciones: Embarazo.

Hipersensibilidad al tamoxifeno o a alguno de los excipientes. Sangrado vaginal no diagnosticado.

Pacientes que requieren terapia concomitante con warfarina o tienen antecedentes de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar si la indicación para el tratamiento es la reducción de la incidencia de cáncer de mama en pacientes de alto riesgo o la reducción del riesgo de cáncer de mama invasivo después del tratamiento del carcinoma ductal in situ.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.