Atropina sulfato, solución oftálmica, 1%, frasco gotero, 10 ml, Vía tópico ocular, código IGSS: 1201

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Midriasis, Cicloplejía, Penalización del ojo sano en el tratamiento de la ambliopía.

Reacciones adversas: Frecuencia no definida: Irritación local, hiperemia, edema, ojos secos, exudado, conjuntivitis folicular, congestión vascular, dermatitis, visión borrosa, respuesta hiperreactiva en niños con síndrome de Down (atropina), somnolencia, aumento de la presión intraocular, fisostigmina.

Precauciones de uso: Fotofobia y visión borrosa debido a la falta de respuesta de la pupila y la cicloplejía pueden durar hasta 2 semanas.
Riesgo de aumento de la presión arterial por absorción sistémica.
Mayor susceptibilidad a reacciones adversas a medicamentos con ciertas afecciones del sistema nervioso central.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.