Bicalutamida, tableta, 50 mg, vía oral, código IGSS: 653

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:
Uso en terapia combinada con un análogo de la hormona luteinizante liberadora de hormonas para el tratamiento del carcinoma metastásico de la próstata en etapa D2.

Reacciones adversas: Sofocos, dolor generalizado, dolor de espalda, astenia, estreñimiento, dolor pélvico, infección, náuseas, disnea, edema, edema periférico, diarrea, hematuria, nicturia, dolor abdominal, anemia.
ginecomastia, erupción, infección del tracto urinario, dolor de pecho, hipertensión, vómitos, síntomas parecidos a la gripe, dolor de cabeza, elevación de pruebas de función hepática, pérdida de peso, anorexia, dolor de mamas, ansiedad, artritis

Precauciones de uso: Se han observado lesiones hepáticas graves e insuficiencia hepática mortal. Vigilar los niveles de transaminasas séricas antes de iniciar el tratamiento, a intervalos regulares durante los primeros cuatro meses de tratamiento y periódicamente a partir de entonces, y para síntomas o signos que sugieran disfunción hepática. Use con precaución en pacientes con deterioro hepático.
Hemorragia con uso concomitante de anticoagulante cumarínico; controlar cercanamente el tiempo de protrombina y la relación normalizada internacional y ajuste la dosis de anticoagulante según sea necesario.
Se han notificado ginecomastia y dolor en las mamas durante el tratamiento con 150 mg cuando se usa como agente único.

Se ha demostrado que los agonistas de la hormona liberadora de hormonas luteinizantes causan una reducción en la tolerancia a la glucosa en varones. Se debe considerar el control de la glucosa en sangre en pacientes que reciben bicalutamida en combinación con agonistas de la hormona liberadora de hormonas luteinizantes.
Se recomienda monitorear el antígeno prostático específico. Si aumenta el antígeno prostático específico, evaluar para la progresión clínica.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Mujeres: Embarazo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.