Clindamicina clorhidrato, cápsula, 300 mg, vía oral, código IGSS: 7.

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: La clindamicina está indicada en el tratamiento de infecciones graves:
Infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo neumonía, empiema y absceso pulmonar causada por microorganismos anaerobios, Streptococcus pneumoniae, otros estreptococos (excepto E. faecalis), y Staphylococcus aureus.
Infecciones de la piel y de la estructura de la piel causadas por Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y anaerobios.
Infecciones ginecológicas que incluyen endometritis, absceso tubo ovárico no gonocócico, celulitis pélvica e infección posquirúrgica del manguito vaginal causada por anaerobios susceptibles.
Infecciones intraabdominales que incluyen peritonitis y abscesos intraabdominales causados por organismos anaerobios susceptibles.
Septicemia causada por Staphylococcus aureus, estreptococos (excepto Enterococcus faecalis) y anaerobios susceptibles.
Infecciones óseas y articulares, incluida la osteomielitis hematógena aguda causada por Staphylococcus aureus y como terapia adyuvante en el tratamiento quirúrgico de enfermedades crónicas, infecciones óseas y articulares debidas a organismos susceptibles.

Reacciones adversas: Dolor abdominal, agranulocitosis, eosinofilia (transitoria), diarrea, crecimiento excesivo de hongos, colitis pseudomembranosa, hipersensibilidad, síndrome de Stevens-Johnson, erupciones, urticaria, hipotensión, náuseas, vómitos, absceso estéril en sitio intramuscular, tromboflebitis, granulocitopenia, neutropenia, trombocitopenia, poliartritis, disfunción renal.

Precauciones de uso: Se ha notificado diarrea asociada a Clostridium difficile con el uso de casi todos los antibacterianos, hasta dos meses después de la administración y puede variar en severidad desde diarrea leve hasta colitis fatal. De ocurrir, suspender el tratamiento.

Shock anafiláctico y reacciones graves de hipersensibilidad incluidas reacciones cutáneas graves como necrólisis epidérmicas tóxicas, reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos y casos de síndrome de Stevens-Johnson algunos con desenlace fatal. En estos casos interrumpir el tratamiento permanentemente e instituir la terapia apropiada.

Contiene como excipiente alcohol bencílico que se ha asociado al síndrome de jadeo y puede ocurrir en neonatos con la administración continua. El riesgo de toxicidad por alcohol bencílico depende de la cantidad administrada además del hígado y la capacidad de los riñones para eliminarlo.

La clindamicina es potencialmente nefrotóxica y se han descrito casos de lesión renal aguda. Considere el control de la función renal, particularmente en pacientes con enfermedades preexistentes. disfunción renal o aquellos que toman medicamentos nefrotóxicos concomitantes.

En caso de insuficiencia renal aguda lesión, suspenda clindamicina cuando no se identifique otra etiología.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a clindamicina, lincomicina o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.