Etinilestradiol + Norgestrel, tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario, vía oral, código IGSS: 320

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento anticonceptivo utilizado para prevenir el embarazo. Para lograr máxima eficacia, debe tomarse según las indicaciones y a intervalos no mayores de 24 horas.

Reacciones adversas: Edema, debilidad, amenorrea, hemorragia intermenstrual, cambio en el flujo menstrual, manchado, anorexia, trombosis venosa profunda, tromboflebitis, depresión, mareos, dolor de cabeza, nerviosismo, somnolencia, sensibilidad mamaria, galactorrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, cambio de peso, ictericia colestásica.

Precauciones de uso: Se debe administrar el fármaco con precaución, evitando tratamientos en pacientes con un evento trombótico arterial o un evento tromboembólico venoso, mujeres con enfermedad hepática (hepatitis viral aguda o cirrosis hepática grave), tumores hepáticos benignos y malignos, una hipertensión no controlada o hipertensión con enfermedad vascular, cefalea, amenorrea u oligomenorrea, antecedentes de depresión, cáncer de mama.
Hay un leve riesgo de desarrollar enfermedad de la vejiga.
Se monitorea a las mujeres pre diabéticas y diabéticas con el tratamiento del fármaco, mujeres con persistente hemorragia (hay o embarazo o neoplasia).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada; cáncer de mama activo o con antecedentes; enfermedad tromboembólica arterial; tromboflebitis; trombosis venosa profunda/ embolia pulmonar, valvulopatía trombogénica; neoplasia dependiente de estrógenos, carcinoma de endometrio, enfermedad hepática, tumores hepáticos; hemorragia vaginal anormal no diagnosticada; hipertensión no controlada; enfermedad vascular cerebral o coronaria; diabetes mellitus con afectación vascular, ictericia con uso previo de anticonceptivos orales; recibir combinaciones de fármacos para la hepatitis C que contengan ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con o sin dasabuvir.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.