Riluzol, tableta de 50 mg, vía oral, código IGSS: 198

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica.

Reacciones adversas: Hipoestesia oral, astenia, náuseas, disminución de la función pulmonar, hipertensión, dolor abdominal, vómitos, artralgia, mareos, boca seca, insomnio, prurito, taquicardia, flatulencia, aumento de la tos, edema periférico, infección del tracto urinario, parestesia circumoral, somnolencia, vértigo, eccema

Precauciones de uso: No se recomienda el uso de riluzol en pacientes con elevaciones basales de aminotransferasas séricas mayores de 5 veces superiores al límite normal; suspenda si hay evidencia de daño hepático.
Aconseje a los pacientes que notifiquen cualquier enfermedad febril debido al riesgo de neutropenia. Suspenda riluzol si se desarrolla, enfermedad pulmonar intersticial.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.