Venlafaxina, tableta o cápsula de liberación prolongada, 75 mg, Vía oral, código IGSS: 2091

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de episodios depresivos mayores, para la prevención de recurrencias de episodios depresivos mayores, tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, tratamiento del trastorno de ansiedad social y tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, náuseas, insomnio, astenia, mareos, trastorno de la eyaculación, somnolencia, boca seca, diaforesis, anorexia, nerviosismo, anorgasmia, pérdida de peso, visión anormal, hipertensión, impotencia, parestesia, temblor, vasodilatación, vómitos, aumento de peso, flatulencia, prurito, bostezando, dispepsia, contracciones, midriasis, angioedema, agranulocitosis, anemia, anuria, aneurisma, bacteriemia, miastenia, síncope, ideación/intento de suicidio.

Precauciones de uso: En estudios a corto plazo, los antidepresivos aumentaron el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas en niños, adolescentes y adultos jóvenes (<24 años) que tomaban antidepresivos para trastornos depresivos mayores y otras enfermedades psiquiátricas.
No aprobado por la FDA para niños; en niños y adultos jóvenes; Los beneficios de tomar antidepresivos deben sopesarse frente a los riesgos.
Vigilar de cerca a todos los pacientes tratados con antidepresivos para detectar un empeoramiento clínico y la aparición de pensamientos y conductas suicidas; Esto debe hacerse durante los primeros 1-2 meses de terapia y ajustes de dosis.
El empeoramiento del comportamiento y las tendencias suicidas que no forman parte de los síntomas presentes pueden requerir la interrupción del tratamiento.

No aprobado por la FDA para el tratamiento de la depresión bipolar.
Al igual que con otros agentes serotoninérgicos, el síndrome serotoninérgico, una condición potencialmente mortal puede ocurrir con el tratamiento con venlafaxina, particularmente con el uso concomitante de otros agentes que pueden afectar el sistema de neurotransmisores serotoninérgicos.
Se puede producir midriasis en asociación con venlafaxina. Se recomienda vigilar estrechamente a los pacientes con presión intraocular elevada o pacientes con riesgo de padecer glaucoma agudo de ángulo estrecho.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad; coadministración con fármacos serotoninérgicos, inhibidores de la monoaminooxidasa, de IMAO (incluidos los IMAO linezolid y azul de metileno intravenoso) dentro de los 14 días anteriores a iniciar venlafaxina o dentro de los 7 días posteriores a la interrupción de venlafaxina, inicio de venlafaxina en pacientes en tratamiento con linezolid o azul de metileno intravenoso.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.