Enzalutamida, cápsula, 40 mg, vía oral, código IGSS: 1968

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Cáncer de próstata resistente a la castración.
Cáncer de próstata metastásico sensible a la castración.

Reacciones adversas: Condiciones asténicas, dolor de espalda, estreñimiento, diarrea, artralgia, sofocos, disminución del apetito, infección del tracto respiratorio superior, edema periférico, dolor musculoesquelético, hipertensión, caídas, dolor de cabeza, disminución de peso, disnea, mareos, debilidad muscular, insomnio, hematuria, fracturas no patológicas, infección del tracto respiratorio inferior y pulmón, disgeusia, compresión medular y síndrome de cauda equina, ansiedad, polaquiuria, prurito, piel seca, epistaxis, condiciones asténicas, hipertensión, compresión medular y síndrome de cauda equina, parestesia, dolor de espalda, trastornos de deficiencia mental, hipoestesia, ginecomastia, artralgia, infección del tracto respiratorio inferior y pulmón, hipertensión, síndrome de piernas inquietas, fracturas no patológicas, hematuria, caídas, debilidad muscular, dolor musculoesquelético, diarrea, edema periférico, dolor de cabeza, disminución de peso, estreñimiento, disnea, mareos, trastornos de deterioro mental, hipoestesia, ansiedad, disminución del apetito, epistaxis, sofocos, disgeusia, síndrome de piernas inquietas, insomnio.

Precauciones de uso: Posible riesgo de convulsiones en pacientes que recibieron enzalutamida. Interrumpa permanentemente en pacientes que puedan desarrollar una convulsión durante el tratamiento.
Posible síndrome de encefalopatía posterior reversible, de presentarse suspender tratamiento con enzalutamida.

En caso de hipersensibilidad: suspenda enzalutamida.

Anticoncepción

Según los resultados de los estudios de reproducción en animales, aconseje a los pacientes masculinos con parejas femeninas con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante los 3 meses posteriores a la dosis final.

Esterilidad:

Basado en estudios con animales, puede afectar la fertilidad en hombres con potencial reproductivo.

Contraindicaciones: Ninguna.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.