Pancrealipasa, tableta o cápsula de liberación retardada 20.000 UI, vía oral, código IGSS: 367

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina asociada a fibrosis quística u otras afecciones.

Reacciones adversas: Dolor/calambres abdominales, dolor de cabeza, Dispepsia, tos, diarrea, hiperglucemia, dolor faringolaríngeo, epistaxis, prurito anal, cálculos biliares, vómitos, contusión, pérdida de peso, saciedad precoz, flatulencia, mareos, hipoglucemia, heces anormales, deposiciones frecuentes, nasofaringitis, anemia, ascitis, flatulencia, edema periférico, hidrocolecistis, Infección vírica, quiste renal, erupción cutánea.
Reacciones alérgicas graves (anafilaxia, asma y urticaria), trastornos cutáneos (prurito, erupción cutánea y urticaria), elevaciones asintomáticas de las enzimas hepáticas, trastornos gastrointestinales (distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea, flatulencia, estreñimiento y náuseas); raros informes de colonopatía fibrosante y síndrome de obstrucción intestinal distal. Respecto al enfoque endocrino, puede afectar al control glucémico en individuos susceptibles.

Precauciones de uso: Se debe administrar la pancrealipasa (producto de enzima pancreática), evitando dosis elevadas, tratamientos prolongados y en pacientes pediátricos con fibrosis quística que puede estar asociado a padecer colonopatía fibrosante. La estenosis colónica (complicación de colonopatía fibrosante) aparece en pacientes pediátricos menores de 12 años con dosis que exceden las 6.000 unidades de lipasa/kg/comida. No se excede la dosis recomendada, a menos que este clínicamente prescrito.

La irritación de la mucosa oral (triturar o masticar las cápsulas) puede ocurrir debido a la pérdida de la cubierta entérica protectora de la cápsula, se provocó una liberación precoz de enzimas. También ocurre cuando se mezcla el contenido de la cápsula con alimentos que tienen un pH más alto de 4.5.
Se recomienda tragar las cápsulas enteras. Si no se puede tragar la cápsula, puede abrirlas y rociar el contenido un alimento blando ácido (pH de 4.5 o menor). Se considera consumir líquidos (zumo, agua, leche materna, fórmula) después de administrar el fármaco. Se inspecciona visualmente la boca de pacientes menores de 12 meses y de los pacientes que pueden tragar.
Las dosis elevadas del fármaco han reportado producir hiperuricemia porque contiene purinas y se debe monitorear los niveles de ácido úrico en sangre de los pacientes con gota, insuficiencia renal o hiperuricemia.

Puede existir un riesgo teórico de transmisión viral relacionado a los virus porcinos que infectan a lo humanos. No se han reportado casos de una enfermedad infecciosa.
Las reacciones de hipersensibilidad graves (anafilaxia, asma, urticaria, prurito) se pueden dar por las proteínas de origen porcino del fármaco.
Si aparecen los síntomas, se inicia un tratamiento, se consideran riesgos y beneficios de continuar dicho tratamiento junto con las necesidades clínicas del paciente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.