# Tropicamida + Clorhidrato de fenilefrina, solución oftálmica, Tropicamida 0.5% + Fenilefrina 5%, frasco gotero, 5 ml, Vía tópico ocular, código IGSS: 10531

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Se emplea como colirio para provocar midriasis y ciclopejia en exploraciones diagnósticas. Se utiliza como vasoconstrictor con anestésicos locales. Cuando se necesita un midriático de acción corta en algunos estados pre-operatorios y post-operatorios.

**Reacciones adversas:** Frecuencia no definida: Efectos oculares, visión borrosa transitoria, agudeza visual reducida, fotofobia, queratitis puntiforme superficial, molestia ocular leve, aumento de la presión intraocular, efectos sistémicos, xerostomía, taquicardia, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, náuseas, vómitos, palidez, trastornos del sistema nervioso central y rigidez muscular notificados con tropicamida, reacciones psicóticas, alteraciones del comportamiento y colapso vasomotor o cardiorrespiratorio en niños, aumento de la presión arterial informado (relacionado con la fenilefrina, en particular, entre otros, recién nacidos prematuros de bajo peso, lactantes y pacientes hipertensos).

**Precauciones de uso:** No se considera adecuada para la cicloplejia en niños. Posible cardiopatía isquémica grave, síndrome de down, los iris con pigmentación oscura son más resistentes a la dilatación pupilar, la midriasis puede precipitar en glaucoma agudo de ángulo estrecho en pocos pacientes, usualmente mayores de

60 años e hipermétropes que tienen predisposición por presentar una cámara anterior profunda; evitar el contacto con lentes de contacto blando.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad conocida al principio activo o excipientes.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.