Anastrozol, tableta, 1 mg, vía oral, código IGSS: 10555

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento adyuvante de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama precoz con receptores hormonales positivos.
Tratamiento de primera línea de mujeres posmenopáusicas con receptores hormonales positivos o Receptores hormonales desconocidos localmente avanzados o cáncer de mama metastásico.
Tratamiento de segunda línea del cáncer de mama avanzado en mujeres posmenopáusicas con progresión de la enfermedad después de la terapia con tamoxifeno.

Reacciones adversas: Sofocos, vasodilatación, fatiga, alteraciones del estado de ánimo, náuseas y vómitos, debilidad, artritis, dolor, artralgia, faringitis, depresión, hipertensión, dolor de huesos, aumento de la tos, osteoporosis, erupción, lesión accidental, dolor de espalda, fractura, dolor de cabeza, insomnio, edema periférico, disnea, dolor abdominal, infección, linfedema, diarrea, estreñimiento, dolor de mama, mareos, infección del tracto urinario, dolor de pecho, dispepsia, parestesia, ansiedad, cataratas, síndrome gripal, sinusitis, vulvovaginitis, xerostomía, neoplasia de mama, bronquitis, quiste, diaforesis, neoplasia, sangrado vaginal, fracturas de columna, cadera o muñeca, enfermedad cardiovascular isquémica, hemorragia vaginal, vaginitis, leucorrea, trombosis venosa profunda, cáncer de endometrio (útero intacto al inicio del estudio), evento cerebrovascular isquémico, aumento de peso, letargo

Precauciones de uso: En mujeres con cardiopatía isquémica preexistente, podría existir un aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares isquémicos ocurridos con el uso de anastrozol en comparación con el uso de tamoxifeno. Considere los riesgos y beneficios.
Pueden ocurrir disminuciones en la densidad mineral ósea, importante considerar monitoreo.
Pueden ocurrir aumentos en el colesterol total, importante considerar supervisión de colesterol.
Toxicidad embriofetal puede ocurrir. Informar a pacientes del riesgo potencial para el feto y aconsejar el uso de métodos anticonceptivos efectivos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Puede causar daño o pérdida fetal; el uso está contraindicado en mujeres que están o pueden quedar embarazadas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.