Bisacodilo, tableta 5 mg, vía oral, código IGSS: 221

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio sintomático del estreñimiento ocasional para adultos, adolescentes y niños mayores de 10 años.

Reacciones adversas: Calambre abdominal, desequilibrio de electrolitos y líquidos., diarrea excesiva, náuseas, ardor rectal, vértigo, vómitos.

Precauciones de uso: No debe tomarse de forma continuada a diario o durante períodos prolongados sin investigar la causa del estreñimiento, el uso durante largos períodos de tiempo puede dar lugar a fenómenos de desequilibrio electrolítico, por lo que se recomienda que antes de iniciar un tratamiento con un laxante, los pacientes estén bien hidratados y que sus niveles de electrolitos sean normales.
Diagnosticar antes del tratamiento la causa del estreñimiento.
Descartar la presencia de apendicitis.
Monitorizar periódicamente los niveles de electrolitos en pacientes ancianos o debilitados.
En niños de 2 a 10 años, se debe administrar exclusivamente bajo control médico.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al medicamento o alguno de los excipientes, Obstrucción o impactación severa Ileo paralítico, Síntomas de apendicitis o abdomen agudo quirúrgico, perforación intestinal, Vómitos, Sangrado rectal, trastorno del metabolismo hídrico y electrolítico, niños menores de 2 años.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.