Espironolactona, tableta, 100 mg, vía oral, código IGSS: 703

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Generalmente en combinación para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca clase III-IV y fracción de eyección reducida a aumentar la supervivencia, controlar el edema y reducir la necesidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Terapia adicional para el tratamiento de la hipertensión, para disminuir la presión arterial en pacientes que no están adecuadamente controlados con otros agentes.
Tratamiento del edema en los siguientes entornos:
Cirrosis del hígado cuando el edema no responde a la restricción de líquidos y sodio.
Síndrome nefrótico cuando el tratamiento de la enfermedad subyacente, la restricción de la ingesta de líquidos y sodio, y el uso de otros diuréticos produce una respuesta inadecuada.
Hiperaldosteronismo primaria en los siguientes entornos:
Tratamiento preoperatorio a corto plazo de pacientes con hiperaldosteronismo primario. Terapia de mantenimiento a largo plazo para pacientes con adenomas suprarrenales discretos productores de aldosterona que no son candidatos a cirugía. Terapia de mantenimiento a largo plazo para pacientes con hiperplasia suprarrenal micro o macronodular bilateral (hiperaldosteronismo idiopático).

Reacciones adversas: Sangrado gástrico, ulceración, gastritis, disminución de la libido, incapacidad para lograr o mantener la erección, sangrado posmenopáusico, dolor de mamas y pezones, trombocitopenia, fiebre, urticaria, erupciones cutáneas maculopapulares o eritematosas, reacciones anafilácticas, vasculitis, hiperpotasemia, alteraciones electrolíticas, hiponatremia, hipovolemia, letargo, confusión mental, ataxia, mareo, dolor de cabeza, somnolencia, disfunción renal

(incluyendo insuficiencia renal), cloasma, somnolencia, letargo, dolor de cabeza, confusión mental, erupción, urticaria, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica toxica, erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos., ginecomastia, impotencia, desórdenes menstruales, calambre abdominal, diarrea, gastritis, náuseas, vómitos, dolor en los senos, leucopenia, alteraciones electrolíticas, calambres en las piernas, mareo, alopecia, prurito.

Precauciones de uso: Monitorear potasio sérico después de una semana del inicio del tratamiento y regularmente, debido al riesgo de hiperpotasemia.
Controle periódicamente el estado del volumen y la función renal debido al riesgo de hipotensión y empeoramiento de la función renal.
Anomalías electrolíticas y metabólicas: controle periódicamente los electrolitos séricos, el ácido úrico y la glucosa en sangre.
Existe riesgo de ginecomastia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. Enfermedad de Addison u otras condiciones asociadas con hiperpotasemia Coadministración con eplerenona.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.