Clomifeno citrato, tableta de 50mg, vía oral, código IGSS: 308

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la infertilidad por anovulación o disovulación (Insuficiencia luteínica y fase lútea corta; síndrome de ovario poliquístico) Test diagnóstico y terapéutico en amenorreas hipotálamo-hipofisiarias o persistentes.

Reacciones adversas: Aumento del volumen ovárico, rubor facial transitorio. Incomodidad abdominal, visión borrosa, molestia en las mamas, nausea, vómitos. fiebre, tinnitus, debilidad, arritmia, dolor de pecho, edema, hipertensión, palpitaciones, flebitis, embolismo pulmonar, taquicardia, tromboflebitis, migraña, parestesia, epilepsias, evento cerebrovascular, sincope, acné, eritema, reacción alérgica, hipertricosis, prurito, urticaria, endometriosis, quiste ovárico, embarazo ectópico, hemorragia uterina, elevación de las transaminasas, hepatitis, pancreatitis, neoplasmas, ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, psicosis, cataratas, edema macular, neuritis óptica, hemorragia retiniana, fotopsias, trombosis retinal, espasmo vascular retinal, perdida de la visión, hipertrigliceridemía, leucocitosis, trastornos de la tiroides.

Precauciones de uso: Antes de iniciar el tratamiento se debe realizar una inspección adecuada de la paciente confirmar que no esté embarazada antes de cada ciclo, descartar insuficiencia ovárica primitiva o fibromas uterinos, el tratamiento debe estar supervisado por un experto en infertilidad durante toda su duración.
El riesgo de un embarazo múltiple aumenta con dosis de 100mg.

Existe el riesgo de padecer alteraciones visuales como escotomas y fotopsias, todas las pacientes deben ser advertidas de los riesgos de realizar actividades que puedan ser peligrosas como manejar automóvil o maquinaria.
Se han reportado casos de hipertrigliceridemía, las pacientes con antecedente personal o familiar deben monitorear los niveles plasmáticos de triglicéridos.
El agrandamiento ovárico puede acompañarse con síntomas como dolor abdominal persistentes incluso semanas luego de descontinuar el tratamiento, se recomienda reducir la dosis y duración de los ciclos de tratamiento en estos casos y no repetir el ciclo terapéutico hasta observar un volumen ovárico normal.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Insuficiencia hipotálamo-hipofisiario. Alteraciones tiroideas o adrenales. Insuficiencia hepática. Hemorragia uterina anormal no diagnosticada. Tumores hormo-dependientes. Quistes ováricos diferentes a SOP. Embarazo. Trastornos visuales. Cáncer endometrial.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.