Ketotifeno fumarato, solución oftálmica al 0.05%, frasco gotero, 5 ml, Vía tópico ocular, código IGSS: 171

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio de los signos y síntomas de las conjuntivitis alérgicas.

Reacciones adversas: No se mencionan reacciones en esta categoría, irritación ocular, dolor ocular, queratitis puntiforme, erosión puntiforme del epitelio corneal, hipersensibilidad, cefalea, visión borrosa durante la instilación, sequedad ocular, alteración palpebral, conjuntivitis, fotofobia, hemorragia conjuntival, sequedad de boca, erupción cutánea, eczema, urticaria, somnolencia, no se mencionan reacciones en esta categoría, no se mencionan reacciones en esta categoría, reacciones de hipersensibilidad locales, incluyendo dermatitis de contacto, hinchazón ocular, prurito y edema palpebral, reacciones alérgicas sistémicas como hinchazón o edema facial, exacerbación de alergias preexistentes como asma y eczema.

Precauciones de uso: No hay advertencias especiales.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. Pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hipertrofia prostática, úlcera péptica estenosante, obstrucción píloro-duodenal y obstrucción del cuello vesical a causa de su efecto atropínico. No administrar a prematuros o recién nacidos.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.