Letrozol, tableta, 2.5 mg, vía oral, código IGSS: 162

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento adyuvante de mujeres posmenopáusicas con receptores hormonales positivos en cáncer de mama en estadios tempranos.
Extensión del tratamiento adyuvante del cáncer de mama en estadios tempranos en mujeres posmenopáusicas que han recibido 5 años de terapia adyuvante con tamoxifeno.
Tratamiento de primera línea de mujeres posmenopáusicas con receptor hormonal positivo o desconocido, en cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.
Tratamiento del cáncer de mama avanzado en mujeres posmenopáusicas con progresión de la enfermedad después de la terapia con antiestrógenos.
La dosis en pacientes con cirrosis y disfunción hepática severa debe reducirse en un 50% (2.5 mg administrados en días alternos).
No se requiere ajuste de dosis para pacientes con insuficiencia renal si el aclaramiento de creatinina es mayor o igual a 10 ml/min.

Reacciones adversas: Diaforesis, dolor de huesos, sofocos, dolor de espalda, disnea, náuseas, sudores nocturnos, tos, fatiga, estreñimiento, hipertensión, dolor de pecho, diarrea, peso decreciente, edema, dolor de mama, fracturas óseas, infección del tracto urinario, hipercalcemia, dolor de cabeza, debilidad, vómitos, osteoporosis, visión borrosa, aumento de los niveles de enzimas hepáticas.

Precauciones de uso:
Pueden ocurrir disminuciones en la densidad mineral ósea, considerar monitoreo de este valor.
Pueden ocurrir aumentos en el colesterol total, considerar monitoreo de este valor.

Puede producirse fatiga, mareos y somnolencia.
Puede causar toxicidad embriofetal cuando se administra a mujeres embarazadas.
Aconseje a mujeres con potencial reproductivo que usen anticoncepción.
Anticoncepción:
Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al menos 3 semanas después de la última dosis.
Esterilidad:
La terapia puede afectar la fertilidad en mujeres y hombres con potencial reproductivo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco o excipientes. Embarazo, mujeres premenopáusicas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.