Exemestano polisorbato 80, tableta, 25 mg, vía oral, código IGSS: 10558

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:
Tratamiento adyuvante de mujeres posmenopáusicas con receptores de estrógeno positivos de cáncer de mama en estadío temprano, que han recibido dos o tres años de tamoxifeno y se cambian a exemestano para completar un total de cinco años consecutivos de terapia hormonal adyuvante.
Tratamiento del cáncer de mama avanzado en mujeres posmenopáusicas cuya enfermedad ha progresado después de la terapia con tamoxifeno.

Reacciones adversas: Fatiga, náuseas, sofocos, depresión, dolor, insomnio, ansiedad, disnea, mareos, dolor de cabeza, edema, vómitos, síndrome seudogripal, dolor abdominal, anorexia, tos, hipertensión, estreñimiento, diarrea, falla cardiaca, pólipos uterinos, hiperplasia endometrial, úlcera gástrica, frecuencia no definida, hepatitis, alteraciones visuales.

Precauciones de uso: Las reducciones en la densidad mineral ósea con el tiempo se observan con uso de exemestano. En pacientes con riesgo o con osteoporosis debe evaluarse formalmente antes y durante el tratamiento la densidad mineral ósea.
Evaluación de rutina de los niveles de 25-hidroxi vitamina D antes del inicio se debe realizar un tratamiento con inhibidores de la aromatasa.
No debe coadministrarse con agentes sistémicos que contengan estrógenos ya que estos podrían interferir con su acción farmacológica.
Puede causar toxicidad embriofetal. Aconsejar a las mujeres de potencial reproductivo del riesgo potencial para un feto y utilizar anticoncepción

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.