Hidróxido de magnesio, suspensión o gel oral, 7% - 8.5%, frasco de 360 ml, vía oral, código IGSS: 217

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento sintomático del estreñimiento ocasional y de la hiperacidez gástrica en adultos y adolescentes de 12 años en adelante.

Reacciones adversas: Calambre abdominal, diarrea, desequilibrio electrolítico, hipotensión, debilidad muscular, depresión respiratoria.

Precauciones de uso: Se debe evitar el uso crónico de hidróxido de magnesio en los siguientes casos:
Los síntomas de estreñimiento (afección orgánica) empeoran o persisten tras 7 días de tratamiento.
Estreñimiento crónico de origen no orgánico y se corrige con una dieta rica en fibra, ingestión de agua (cantidad adecuada), ejercicio físico y regular la defecación.
No se administra el tratamiento antiácido por lapsos de tiempo mayores a 2 semanas sin control médico. En niños menores de 12 años no se recomienda la administración incontrolada de antiácidos por enmascarar síntomas de procesos abdominales agudos, como apendicitis.
En el caso de padecer insuficiencia renal no grave, se monitorean los valores de electrolitos en sangre.
En caso de enfermedades cardíacas, insuficiencia hepática, pacientes de edad avanzada o débiles, se realiza un control de éstos. En la población pediátrica (niños) puede provocar hipermagnesemia, principalmente con insuficiencia renal o deshidratación.

Este fármaco contiene 50 mg de sorbitol en cada ml, no se debe administrar en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa. Este fármaco contiene sacarosa, no se debe administrar en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa - isomaltasa.
Este fármaco contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por ml, lo cual indica que está exento de sodio.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento.
Pacientes con insuficiencia renal grave, situaciones de desequilibrio hidroelectrolítico (riesgo de hipermagnesemia), con algún síntoma de apendicitis (abdomen agudo quirúrgico), de obstrucción o perforación intestinal, hemorragia gastrointestinal o rectal no diagnosticada, colitis ulcerosa, colostomía, diverticulitis, ileostomía, diarrea crónica, daño miocárdico o bloqueo cardíaco.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.