# Ofloxacina, tableta o cápsula, 400 mg, vía oral, código IGSS: 57

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Tratamiento de adultos con infecciones leves a moderadas (a menos que se indique lo contrario) causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados en las infecciones enumeradas a continuación:

- Exacerbaciones bacterianas agudas de la bronquitis crónica por Haemophilus influenzae o Streptococcus pneumoniae.
- Neumonía adquirida en la comunidad Las reacciones adversas (incluidas las convulsiones) pueden ocurrir con o sin una elevación de la debida a Haemophilus influenzae o Streptococcus pneumoniae.
- Infecciones de la piel y de la piel sin complicaciones debidas a Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes o Proteus mirabilis sensibles a la meticilina.
- Gonorrea uretral y cervical aguda no complicada debida a Neisseria gonorrhoeae.
- Uretritis y cervicitis no gonocócicas por Chlamydia trachomatis.
- Infecciones mixtas de la uretra y el cuello uterino por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae.
- Enfermedad inflamatoria pélvica aguda (incluida la infección grave) debida a Chlamydia trachomatis y/o Neisseria gonorrhoeae.
- Cistitis no complicada con ampollas, edema) que involucra áreas expuestas a la luz (típicamente la cara, el área "V" del cuello, debido a Citrobacter diversus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis o Pseudomonas aeruginosa.

- Infecciones complicadas del tracto urinario debidas a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis, o Pseudomonas aeruginosa.
- Prostatitis por Escherichia coli.

**Reacciones adversas:** Náuseas, dolor de cabeza, insomnio, mareos, vaginitis, diarrea, vómitos, apetito disminuido, calambres abdominales, sabor anormal, dolor de pecho, prurito genital externo en mujeres, fatiga, flatulencia, malestar, gastrointestinal, nerviosismo, faringitis, pirexia, erupción/prurito, trastornos del sueño, alteraciones visuales, xerostomía, intervalo QT prolongado, torsades de pointes, síncope, vasculitis, edema, hipertensión arterial, palpitaciones, vasodilatación, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica toxica, agranulocitosis, anemia aplásica, pancitopenia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, hepatitis aguda, falla hepática, necrosis hepática, reacción de hipersensibilidad inmune, rotura de tendón, tendinitis, neuropatía periférica, convulsión, fallo renal agudo, nefritis intersticial, insuficiencia renal, síndrome de tourette, disminución de la agudeza auditiva, tinnitus.

**Precauciones de uso:** Las fluoroquinolonas se han asociado con reacciones adversas graves incapacitantes y potencialmente irreversibles que se han producido juntas, entre ellas: tendinitis y rotura de tendones, neuropatía periférica y efectos sobre el sistema nervioso central. Suspenda el medicamento de inmediato y evite el uso en pacientes que experimenten cualquiera de estas reacciones adversas graves.

Puede exacerbar la debilidad muscular en pacientes con miastenia grave; deben evitarse en pacientes con antecedentes conocidos de miastenia grave.

Se han asociado con reacciones adversas graves, por lo que se tiene que reservar el uso del fármaco en pacientes que no tengan opciones de tratamiento alternativas para las siguientes indicaciones: sinusitis bacteriana aguda; exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis crónica

Se ha notificado diarrea asociada a Clostridium difficile con el uso de casi todos los antibacterianos, hasta dos meses después de la administración y puede variar en severidad desde diarrea leve hasta colitis fatal. De ocurrir, suspender el tratamiento. Podría provocar incremento en efectos del sistema nervioso central como convulsiones, presión intracraneal elevada y psicosis tóxica.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a la ofloxacina o a cualquier miembro de la clase de antibacterianos de las quinolonas.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.