Tetracaína, solución oftálmica, 0.5%, frasco gotero de 10 ml, Vía tópico ocular, código IGSS: 2250

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Procedimientos que requieren una acción rápida y corta de un anestésico tópico oftálmico.

Reacciones adversas: Frecuencia no definida: Ansiedad, inquietud, nerviosismo, mareo, visión borrosa, enrojecimiento conjuntival, lagrimeo, fotofobia, temblores, contracciones, somnolencia, inconsciencia, paro respiratorio, náuseas vómitos, escalofríos, tinitus, depresión miocárdica, hipotensión, paro cardiaco, temblores, reacciones anafilactoides (a veces fatales).

Precauciones de uso: No utilizar intracamaralmente, puede provocar daños en las células endoteliales de la córnea.
Toxicidad epitelial corneal y puede manifestarse como defectos epiteliales, que pueden progresar a daño corneal permanente.
Riesgo de lesiones accidentales por insensibilidad del ojo, no tocarlos durante al menos 10 a 20 minutos después de usar el anestésico.
No está destinado a la autoadministración del paciente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al ácido aminobenzoico, sulfitos, parabenos o cualquier componente de la preparación. Anestesia espinal.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.