Amlodipina, tableta, 5 mg, vía oral, código IGSS: 1364

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hipertensión, enfermedad de las arterias coronarias, solo o en combinación con otros agentes anti anginosos. Tratamiento de la angina vasoespástica confirmada o sospechada, para reducir el riesgo de hospitalización por angina y para reducir el riesgo de un procedimiento de revascularización coronaria.

Reacciones adversas: edema, dolor de cabeza, fatiga, palpitaciones, mareos, náuseas, enrojecimiento, dolor abdominal, somnolencia, astenia, prurito, erupción cutánea, calambres musculares, disfunción sexual masculina, arritmia (p. ej., taquicardia ventricular, fibrilación auricular), bradicardia, dolor torácico, isquemia periférica, síncope, taquicardia, vasculitis, hipoestesia, neuropatía periférica, parestesia, temblor, vértigo, anorexia, estreñimiento, disfagia, diarrea, flatulencia, pancreatitis, vómitos, hiperplasia gingival, reacción alérgica, astenia, dolor de espalda, sofocos, malestar, dolor, escalofríos, aumento de peso, disminución de peso, artralgia, artrosis, calambres musculares, mialgia, disfunción sexual (masculina y femenina), insomnio, nerviosismo, depresión, sueños anormales, ansiedad, despersonalización, disnea, epistaxis, piel y anejos: angioedema, eritema multiforme, prurito, exantema, exantema eritematoso, exantema maculopapular, visión anormal, conjuntivitis, diplopía, dolor ocular, tinnitus, frecuencia de la micción, trastorno de la micción, nicturia, boca seca, aumento de la sudoración, hiperglucemia, sed, leucopenia, púrpura, trombocitopenia.

Precauciones de uso:

Posible hipotensión somática particularmente en pacientes con estenosis aortica.

La angina de pecho y el infarto agudo de miocardio pueden empeorar después iniciar o aumentar la dosis particularmente en pacientes con enfermedad arterial coronaria obstructiva grave.
Titular lentamente en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.