Insulina Glargina, solución inyectable, 100 UI/ ml, vial 10 ml, vía subcutánea, código IGSS: 2064

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes con diabetes mellitus en adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años.

Reacciones adversas: Cefalea, síndrome pseudogripal, dispepsia, diarrea, dolor de espalda, faringitis, lipodistrofia, lipohipertrofia, taquicardia, reacción alérgica loca, hipocalemia, edema periférico.

Precauciones de uso: Antes de modificar el tipo o marca de insulina utilizada por un paciente se debe evaluar junto a un médico ya que estos cambios puedes resultar en cambio en la dosis.
La insulina glargina es una insulina con efecto a largo plazo, no debe utilizarse para el tratamiento de la cetoacidosis diabética.
Se debe utilizar con precaución en casos donde disminuya la necesidad de insulina como: diarrea, nausea, vómitos, malabsorción, hipotiroidismo, insuficiencia renal y hepática.
Los pacientes que presenten fiebre, hipertiroidismo, trauma, infección o cirugía pueden requerir aumento en la dosis.
Se debe administrar con precaución cuando se utilizan fármacos que disminuyan el potasio sérico ya que puede causar hipocalemia.
Utilizar con precaución en pacientes geriátricos, las dosis utilizadas deben controlarse con el fin de evitar la hipoglicemia.

Se debe notificar a los usuarios sobre los síntomas de la hipoglicemia, la falta de corrección de la misma puede causar pérdida de conocimiento, coma o muerte.

El uso de dosis no adecuadas o supresión del tratamiento puede llevar a hiperglucemia y cetoacidosis diabética, es importante monitorizar los niveles séricos de glicemia de manera continua y verificar el grado de cumplimiento del tratamiento antes de realizar un ajuste de dosis.
Se prefiere realizar una rotación continua del punto de inyección para reducir el riesgo de padecer lipodistrofia y amiloidosis cutánea.
Se ha asociado un posible riesgo de padecer cáncer con el uso de insulina glargina.
El uso de insulina con tiazolidinedionas puede causar retención de líquidos y exacerbar la falla cardiaca.
El riesgo de hipoglicemia puede aumentar con la coadministración de agentes antidiabéticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores del receptor de angiotensina, salicilatos, DDD4 inhibidores, inhibidores SGLT2.
La coadministración con antipsicóticos atípicos, corticoesteroides, diuréticos, estrógenos, glucagón, isoniazida, niacina, anticonceptivos orales, fenotiazinas, progestágenos, somatropina, agentes simpatomimeticos pueden disminuir el riesgo de hipoglicemia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Hipoglicemia. Vía intravenosa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.