Lactulosa, jarabe 10 g/ 15 ml, frasco de 240 ml, vía oral, código IGSS: 223

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento para el estreñimiento, el ablandamiento de las heces y facilitación de la defecación en pacientes con entidades nosológicas que afecta al recto y ano (hemorroides, fisura anal, fístulas, abscesos anales, úlceras solitarias y post-cirugía recto – anal.
Tratamiento y prevención de la encefalopatía hepática portosistémica (encefalopatía portosistémica).

Reacciones adversas: Deshidratación, diarrea, actividad intestinal excesiva, hipernatremia, hipopotasemia, náuseas, vómitos, calambres abdominales, distensión abdominal, eructos, flatulencia.

Precauciones de uso: Se deben evaluar los síntomas de dolor abdominal de causa indeterminada antes de iniciar el tratamiento y así excluir una perforación no diagnosticada, una posible obstrucción u otras enfermedades o condiciones no diagnosticadas.
Las dosis y/o medidas adicionales del fármaco deben reconsiderarse cuando hay insuficiencia de efecto terapéutico después de muchos días.
Se debe administrar lactulosa con precaución, evitando el uso crónico de dosis no ajustadas y el uso incorrecto, lo cual puede producir diarrea y trastornos del equilibrio de electrolitos.
Se debe tomar en cuenta que el reflejo de defecación se puede afectar durante el tratamiento.
La dosis normal en el estreñimiento no supone un riesgo para los pacientes diabéticos. La dosis en el tratamiento de la encefalopatía hepática por ser alta se

tiene que considerar en los pacientes diabéticos; 15 ml de lactulosa tiene 10.2 kilocalorías.

El tratamiento prolongado y/o dosis elevadas de lactulosa pueden producir hipopotasemia e hipernatremia. Se recomienda un control periódico de lo electrolitos.

En caso de pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa (galactosemia) o a la fructosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no toman este fármaco porque contiene lactosa, galactosa y fructosa.

La lactulosa se administra con precaución en pacientes intolerantes a la lactosa.

En la población pediátrica (niños), el uso de laxantes es excepcional y bajo supervisión médica.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los excipientes en el medicamento. Pacientes con galactosemia (necesidad de una dieta baja en galactosa), con obstrucción, perforación o riesgo de perforación gastrointestinal.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.