Ciclosporina "A", solución oftálmica, 0.1%, frasco gotero de 5 ml, Vía tópico ocular, código IGSS: 10528

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad del ojo seco.
Reacciones adversas: Dolor en los ojos, hiperemia conjuntival, descargar, epifora, dolor de ojo, sensación de cuerpo extraño, escozor, alteración visual (p. ej., visión borrosa), agudeza visual reducida, tos, hiperemia ocular, dolor de cabeza e infección del tracto respiratorio superior, malestar ocular, prurito ocular.

Precauciones de uso: No se deben tocar las mucosas oculares u otras superficies con la punta de la botella. Evitar el uso de lentes de contacto durante la administración, deben ser removidos 15 min antes de la aplicación y deben ser colocados 15 min después de la misma.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida o sospechada a cualquiera de los ingredientes de la formulación.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.