Clopidogrel, tableta, 75 mg, vía oral, código IGSS: 185

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Reducción de la tasa de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en pacientes que deben ser tratados medicamente y los que deben ser manejados con revascularización coronaria; debe administrarse junto con aspirina.
Reducción de la tasa de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que deben ser tratados medicamente; y debe administrarse junto con aspirina.
Reducción de la tasa de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en pacientes con enfermedad arterial periférica establecida o con antecedentes de infarto de miocardio reciente o accidente cerebrovascular reciente.

Reacciones adversas: Infección del tracto respiratorio superior, dolor torácico, dolor de cabeza, síndrome gripal, artralgia, dolor, mareos, diarrea, erupción, rinitis, depresión, infección del tracto urinario, neutropenia severa, púrpura trombocitopénica trombótica, insuficiencia hepática aguda, anemia aplásica, hipotensión, hepatitis, mialgia, eczema, eritema, agranulocitosis.

Precauciones de uso: Actividad antiplaquetaria disminuida en pacientes con CYP2C19 alterado. Evite el uso concomitante de clopidogrel con omeprazol o esomeprazol porque ambos reducen significativamente la actividad antiplaquetaria de clopidogrel.

Riesgo general de sangrado por la inhibición de la agregación plaquetaria durante toda la vida de la plaqueta. Evite el uso concomitante de inductores potentes de CYP2C19.
Si el tratamiento con clopidogrel debe ser suspendido temporalmente debe ser reiniciado lo antes posible y reanudar tan pronto como se logre la hemostasia.
Se ha informado púrpura trombocitopénica trombótica, a veces fatal, después del uso de clopidogrel.
Se ha informado hipersensibilidad que incluye erupción cutánea, angioedema o reacción hematológica en pacientes que reciben clopidogrel, incluidos pacientes con antecedentes de hipersensibilidad o problemas hematológicos de reacción a otras tienopiridinas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Sangrado patológico activo (p. ej., úlcera péptica, hemorragia intracraneal).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.