Gliclazida, tableta o cápsula de liberación modificada, 60 mg, vía oral, código IGSS: 10861

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes para controlar la glicemia.

Reacciones adversas: Hipoglicemia, hipertensión, angina pectoris, edema periférico, cefalea, mareo, depresión, insomnio, neuralgia, dermatitis, rash, hiperglicemia, hiperlipidemia, alteración en el metabolismo de los lípidos, diarrea, constipación, gastroenteritis, dolor abdominal, gastritis, nausea, infección del tracto urinario, infección viral, dolor de espalda, artralgia, astenia, artropatía, mialgia, artritis, tendinopatía, conjuntivitis, otitis media, bronquitis, rinitis, faringitis, infección respiratoria superior, tos, neumonía, sinusitis, aumento de lactato deshidrogenasa, aumento de la creatinina.

Precauciones de uso: El fármaco se asocia al padecimiento de hipoglicemia, es importante que los pacientes que utilizaran el fármaco tengan una ingesta regular de carbohidratos.

El riesgo de hipoglicemia es mayor en pacientes con dietas bajas en calorías, después de ejercicio extenuante, después del consumo de alcohol, uso en combinación con otros hipoglicemiantes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática grave, trastornos tiroideos, hipopituitarismo e insuficiencia suprarrenal.

Las sulfonilureas orales se asocian a un mayor riesgo cardiovascular que otros hipoglicemiantes.

Existe un riesgo potencial de padecer una reacción alérgica a las sulfonilureas en pacientes con historia conocida de alergia a las sulfonamidas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al compuesto. Diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal y hepática, precoma y coma diabético, embarazo, lactanica, tratamiento concomitante con miconazol.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.