Sunitinib Maleato, cápsula 50 mg, vía oral, código IGSS: 10520

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tumor del estroma gastrointestinal: Tratamiento de pacientes adultos con tumor del estroma gastrointestinal después de la progresión de la enfermedad o intolerancia al mesilato de imatinib.
Carcinoma de células renales avanzado: Tratamiento de pacientes adultos con carcinoma de células renales avanzado.
Tratamiento adyuvante del carcinoma de células renales: Tratamiento adyuvante de pacientes adultos con alto riesgo de carcinoma de células renales recurrente después de nefrectomía.
Tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados: Tratamiento de tumores neuroendocrinos pancreáticos progresivos y bien diferenciados en pacientes adultos con enfermedad metastásica o localmente avanzada irresecable.

Reacciones adversas: Dispepsia (cáncer de células renales metastásico)
Gusto alterado (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).
Fatiga (tumor del estroma gastrointestinal; cáncer de células renales metastásico).
Diarrea (tumor del estroma gastrointestinal; cáncer de células renales metastásico).
Erupción (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).
Vómitos (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).
Estreñimiento (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Decoloración de la piel (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Dolor abdominal (tumor del estroma gastrointestinal; cáncer de células renales metastásico).

Náuseas (tumor del estroma gastrointestinal; cáncer de células renales metastásico).

Anorexia (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Mucositis/estomatitis (tumor del estroma gastrointestinal; cáncer de células renales metastásico).

Disnea (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Hipertensión arterial (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Artralgia (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Sangrado (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Dolor de cabeza (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Astenia (tumor del estroma gastrointestinal).

Linfopenia (cáncer de células renales metastásico).

Fiebre (tumor del estroma gastrointestinal; cáncer de células renales metastásico).

Dolor en las extremidades (cáncer de células renales metastásico).

Dolor de espalda (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Mialgia (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Tos (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal 8%).

Piel seca, Cambios de color de cabello

Neutropenia (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).

Alopecia (cáncer de células renales metastásico).
Síndrome mano-pie (cáncer de células renales metastásico; tumor del estroma gastrointestinal).
Deshidratación (cáncer de células renales metastásico).
Eventos trombóticos venosos, hemorroides, pancreatitis, síndrome parecido a la gripe.
Hepatotoxicidad, fallo renal agudo, disfunción suprarrenal.

Precauciones de uso: Se ha observado insuficiencia hepática mortal. Monitorear pruebas de función hepática al inicio del estudio, durante cada ciclo y según esté clínicamente indicado. Interrumpir por hepatotoxicidad de grado 3 hasta resolución a grado 1 o menor y reanudar en dosis reducida.
Posible isquemia miocárdica, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía y disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del límite inferior de lo normal, incluida la muerte. Vigilar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva y considerar monitorear la fracción de eyección del ventrículo izquierdo al inicio y periódicamente durante el tratamiento. Suspenda ante manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca congestiva.

Monitoree a los pacientes en mayor riesgo de desarrollar prolongación del intervalo QT. Considerar monitorización de electrocardiogramas y electrolitos.
Controle la presión arterial al inicio y clínicamente indicado. Iniciar y/o ajustar el tratamiento antihipertensivo según corresponda, interrumpir en caso de hipertensión grado 3 hasta resolución a grado 1 o menor y reanudar en dosis reducida.
Hemorragia relacionada con el tumor y perforación de vísceras (ambos con eventos fatales) han ocurrido.
Posible síndrome de lisis tumoral principalmente en pacientes con cáncer de células renales metastásico y tumor del estroma gastrointestinal.

La microangiopatía trombótica incluida la purpura trombocitopénica y síndrome urémico hemolítico pueden provocar insuficiencia renal o desenlace fatal.
Posibles toxicidades dermatológicas como fascitis necrotizante, eritema multiforme, Síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.
Posible síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible.
Controle la función tiroidea al inicio del estudio, periódicamente durante el tratamiento y según esté clínicamente indicado.
Controle los niveles de glucosa en sangre con regularidad y evalúe si se requieren modificaciones en la dosis de los medicamentos antidiabéticos.
Posible Osteonecrosis de la mandíbula por lo que el tratamiento debe suspenderse durante al menos 3 semanas antes del procedimiento dental invasivo.
Anticoncepción:
Mujeres en edad fértil: Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante al menos 4 semanas después de la dosis final.
Hombres con parejas femeninas con potencial reproductivo: Utilicen un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante 7 semanas después de la dosis final.
Esterilidad:
Según los hallazgos en animales, la fertilidad masculina y femenina puede verse afectada.

Contraindicaciones: Ninguna.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.