Bifonazol, Solución 1%, frasco, 15 ml, vía tópica, código IGSS: 2032

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Está indicado para el tratamiento de tinea pedis o pie de atleta en adultos y adolescentes a partir de 12 años.
Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antifúngicos.

Reacciones adversas: Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Dermatitis de contacto, dermatitis alérgica, eritema, prurito, exantema, urticaria, ampollas, exfoliación cutánea, eccema, sequedad de piel, irritación cutánea, maceración de la piel, sensación de ardor en la piel.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración: Dolor en el lugar de administración, edema periférico en el lugar de administración.

Precauciones de uso: Solo para uso externo. No ingerir.
Debe evitarse el contacto del medicamento con los ojos y las mucosas. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar con un oftalmólogo si fuese necesario.
Cuando se administren medicamentos que contengan bifonazol, se deberá tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a otros antimicóticos imidazólicos (p. ej., econazol, clotrimazol, miconazol). En caso de reacción de hipersensibilidad, se deberá suspender el tratamiento y aplicar las medidas terapéuticas adecuadas.
Los pacientes en tratamiento con warfarina deben ser vigilados cuando se utilice bifonazol de forma concomitante.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al bifonazol, imidazoles en general o a alguno de los excipientes de este medicamento

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.