Clorfeniramina maleato, jarabe 2 mg/ 5 ml, frasco 100 ml- 120 ml, vía oral, código IGSS: 1120

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio sintomático de afecciones alérgicas, conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis medicamentosa, dermografismo, angioedema, picadura y mordeduras de insectos.
Trastornos cutáneos pruriginosos (prurito), rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne, rinitis vasomotora o intrínseca, manifestaciones alérgicas cutáneas no complicadas y reacciones a sangre o plasma, urticaria producida por sustancias medicamentosas o por intolerancia a ciertos alimentos.

Reacciones adversas: Somnolencia, sedación, mareos, cefaleas y debilidad muscular, estimulación del sistema nervioso central manifestado con alucinaciones, ataxia, insomnio, palpitaciones, psicosis y en casos muy severos convulsiones; discrasias sanguíneas como agranulocitosis, trombocitopenia, pancitopenia, anemia aplásica y anemia hemolítica, y puede afectar el sentido del olfato y el gusto; actividad anticolinérgica que se traduce en aumento de las secreciones bronquiales, xerostomía, retención urinaria, midriasis y visión borrosa. Náusea/vómitos, constipación y dolor abdominal. Hipertensión, hipotensión taquicardia sinusal, extrasístoles, palpitaciones y arritmias cardíacas.

Precauciones de uso: Administrarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, presión intraocular aumentada, hipertensión arterial, hipertiroidismo, úlcera péptica, obstrucción piloroduodenal, obstrucción del cuello

de la vejiga, asma bronquial, enfermedades cardiovasculares o hipertrofia prostática. Retención urinaria, embarazo.

El uso concomitante con alcohol, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos u otros depresores del sistema nervioso central puede potenciar el efecto sedante de la clorfeniramina.

Contraindicaciones: No administrar a neonatos y prematuros por la posibilidad de estimulación al sistema nervioso central lo cual puede conducir incluso a convulsiones, ni a pacientes bajo tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa o tras su interrupción al menos durante dos semanas por riesgo de hipotensión severa.
En pacientes con hipersensibilidad a la clorfeniramina. La actividad anticolinérgica puede agravar ataques agudos de asma o la enfermedad obtructiva crónica.
Puede producir efectos oculares como ojo seco y la visión borrosa.
Se ha señalado un agravamiento de los síntomas en pacientes con obstrucción de la vejiga o del íleon, hiperplasia benigna de próstata o retención urinaria.
La clorfeniramina es extensamente metabolizada en el hígado de manera que su metabolismo puede verse afectado en casos de insuficiencia hepática.
Se debe usar con precaución en los enfermos cardiacos, puede producir taquicardia, hipotensión y arritmias.
Contiene sacarosa y sorbitol, no administrar en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa o galactosa o deficiencia de sacarasa isomaltasa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.