Fenitoína sódica, suspensión oral, 125 mg/ 5 ml, frasco de 120- 180 ml, vía oral, código IGSS: 849

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado en el tratamiento de convulsiones tónico- clónicas, convulsiones psicomotoras.

Reacciones adversas: Somnolencia**,** fatiga, ataxia, irritabilidad, dolor de cabeza, inquietud, habla arrastrada, nerviosismo, nistagmo, mareo, vértigo, disartria, parestesia, sarpullido, prurito, hiperplasia gingival (pacientes pediátricos), ataxia, convulsión paradójica, convulsión por abstinencia de drogas, diplopía, psicosis (dosis alta), ambliopía tóxica, encefalopatía, trastorno de la conducción av, fibrilación ventricular, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, anemia megaloblástica (deficiencia de folato), hipocalcemia, hepatotoxicidad, hipertricosis linfadenopatía, incluida hiperplasia benigna de los ganglios linfáticos, seudolinfoma, linfoma y la enfermedad de hodgkin, síndrome del guante morado
sarpullido, reacciones alérgicas en forma de exantema o, raramente, formas más graves (reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos) o anafilaxia, erupción purpúrica, necrolisis epidérmica toxica, dermatitis ampollosa, exfoliativa o purpúrica, engrosamiento de los rasgos faciales, periarteritis nodosa, anomalías de inmunoglobulina, sensación del gusto alterada, incluido el sabor metálico, enfermedad de peyronie.
Intravenosa >50 mg/min
Depresión del sistema nervioso central, colapso cardiovascular, hipotensión, extraño, discinesia, oftalmoplejía, nefrotoxicidad, síndrome de stevens-johnson, lupus eritematoso, raquitismo, osteomalacia, informes posteriores a la

comercialización, atrofia cerebelosa, angioedema, pustulosis exantemática generalizada, urticaria, sistema hematológico y linfático: trombocitopenia, leucopenia, granulocitopenia, agranulocitosis, aplasia pura de glóbulos rojos y pancitopenia con o sin supresión de la médula ósea

Precauciones de uso: Convulsión precipitada por abstinencia.
Comportamiento e ideas suicidas.
Precauciones dermatológicas graves: suspender al primer signo de una erupción, a menos que la erupción claramente no está relacionada con el medicamento.
Reacción del fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos/ Hipersensibilidad multiorgánica).
Efectos cardiacos como bradicardia y paro cardíaco.
Angioedema: suspender si aparecen síntomas de angioedema como edema facial, perioral o de las vías respiratorias superiores.
Daño hepático: se han informado casos de hepatotoxicidad aguda.
Complicaciones hematopoyéticas: si ocurre, debe utilizarse un tratamiento antiepiléptico alternativo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada a fenitoína o a sus componentes.
Antecedentes de hepatotoxicidad aguda previa, atribuible a fenitoína.
Coadministración con delavirdina.
Bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, bloqueo AV de segundo y tercer grado.
Síndrome de Stokes-Adams.
Antecedentes de hepatotoxicidad aguda previa atribuible a fenitoína.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.