Hierro aminoquelado + ácido fólico, tableta, 30 mg + 250-300 mcg, vía oral, código IGSS: 599

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta

Indicaciones de uso: Profilaxis y tratamiento de anemia ferropénica y deficiencia de ácido fólico, en infantes, niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Reacciones adversas: Dolor abdominal, acidez de estómago, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, heces de coloración oscura.
Reacciones alérgicas, específicamente broncospasmo, eritema, erupción cutánea y prurito.
úlceras en la boca, lesiones esofágicas o necrosis bronquial, por administración inadecuada. Reacción anafiláctica.

Precauciones de uso: Una vez alcanzados los niveles de ferritina sérica de 20 µg/L o más, se recomienda continuar el tratamiento con dosis de mantenimiento. Evitar su administración por más de 6 meses, excepto en pacientes con sangrado continuo, menorragia o embarazos repetidos. Una ingesta masiva puede causar en intoxicación.
Los preparados líquidos que contienen sales de hierro deben tomarse a través de una pajita para prevenir el oscurecimiento de los dientes.
Precaución en pacientes con almacenamiento de hierro enfermedades de absorción de hierro tales como enfermedad inflamatoria de intestino, estenosis intestinal y divertículos.
El ácido fólico puede oscurecer el diagnóstico de anemia perniciosa.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Sobrecarga de hierro (ej. hemocromatosis, hemosiderosis). Pacientes sometidos a transfusiones sanguíneas repetidas. Terapia concomitante parenteral u oral. Anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. En casos de anemia perniciosa, úlcera duodenal, carcinoma del estómago, o colitis ulcerosa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.