Lansoprazol, cápsula de liberación retardada 30 mg, vía oral, código IGSS: 150

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento a corto plazo (durante cuatro semanas) para la curación y el alivio de los síntomas de la úlcera duodenal activa.
Como terapia triple en combinación(lansoprazol/amoxicilina/claritromicina) para el tratamiento de pacientes con infección por H. pylori y duodenal, enfermedad ulcerosa (úlcera duodenal activa o de un año de evolución) para erradicar H. pylori.
Como terapia dual (lansoprazol/amoxicilina) para el tratamiento de pacientes con infección por H. pylori y enfermedad ulcerosa duodenal (activo o antecedentes de un año de úlcera duodenal) que son alérgicos o intolerantes a claritromicina o en quienes se conoce o se sospecha resistencia a la claritromicina
Mantenimiento de la cicatrización de las ulceras del duodeno.
Tratamiento a corto plazo (hasta ocho semanas) para la cicatrización y el alivio de los síntomas de la úlcera gástrica benigna activa.
Tratamiento de la úlcera gástrica asociada a AINE en pacientes que continúan tomando AINE.
reducir el riesgo de úlceras gástricas asociadas a AINE en pacientes con antecedentes de úlcera gástrica documentada que requieren el uso de un AINE.
Tratamiento a corto plazo en adultos y pacientes pediátricos de 12 a 17 años (hasta ocho semanas) y pacientes pediátricos de uno a 11 años (hasta 12 semanas) para el tratamiento de la acidez estomacal y otros síntomas asociados con enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Tratamiento a corto plazo en adultos y pacientes pediátricos de 12 a 17 años de edad (hasta ocho semanas) y pacientes pediátricos de uno a 11 años de edad (hasta 12 semanas) para la curación y el alivio de los síntomas de todos los grados de esofagitis erosiva

Mantenimiento de la cicatrización de la esofagitis erosiva.
Tratamiento a largo plazo de afecciones hipersecretoras patolgicas, incluido el síndrome de Zollinger-Ellison.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal, ansiedad, angina de pecho, palpitaciones, síncope, edema, anorexia, boca seca, tenesmo, flatulencia, melena, mialgia, tinnitus, reacción alérgica.

Precauciones de uso: Respuesta al tratamiento no impide la presencia de malignidad gástrica.
Si se presenta nefritis tubulointersticial aguda suspender el tratamiento y evaluar.
Terapia con inhibidores de bomba de protones puede sugerir un mayor riesgo de Clostridium difficile asociado a diarrea.
Terapia con inhibidores de bomba de protones a largo plazo y con múltiples dosis diarias puede estar asociado con un mayor riesgo de osteoporosis, fracturas de cadera, muñeca o columna vertebral.
Suspender en el primer signo o síntoma de reacciones adversas cutáneas graves u otros signos de hipersensibilidad y considere una evaluación adicional.
Puede provocar exacerbación o aparición de lupus eritematoso cutáneo y sistémico.
Uso diario a largo plazo (por ejemplo, más de 3 años) puede provocar malabsorción o una deficiencia de cianocobalamina.
Los aumentos en el pH intragástrico pueden resultar en hipergastrinemia e hiperplasia de células tipo enterocromafines y aumento en niveles de cromogranina A que pueden interferir con el diagnóstico de tumores neuroendocrinos.
Uso concomitante con metotrexato puede elevar y/o prolongar las concentraciones séricas de metotrexato y/o su metabolito, lo que posiblemente produzca toxicidad. con dosis alta administración de metotrexato, considere la suspensión temporal de lansoprazol.
Riesgo de pólipos de las glándulas fúndicas que aumenta con el uso a largo plazo (más de 1 año).

No recomendado en menores de un año debido al riesgo de engrosamiento de las válvulas cardíacas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al lansoprazol u otros inhibidores de la bomba de protones.
Administración concomitante con productos que contienen rilpivirina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.