Levodopa + Carbidopa, tableta o comprimido, 250 mg + 25 mg, vía oral, código IGSS: 920

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la enfermedad de Parkinson, parkinsonismo postencefalítico y parkinsonismo sintomático que puede seguir a una intoxicación por monóxido de carbono o intoxicación por manganeso.

Reacciones adversas: Complicación de la inserción del dispositivo, náuseas, estreñimiento, eritema en el lugar de la incisión, discinesia, depresión, alta postprocesal, edema periférico, hipertensión, infección del tracto respiratorio superior, dolor orofaríngeo, atelectasia, estado de confusión, ansiedad, mareos, hernia de hiato, íleo postoperatorio, trastorno del sueño, pirexia, exceso de tejido de granulación, erupción, bacteriuria, glóbulos blancos en orina positivos, alucinación, trastorno psicótico, diarrea, dispepsia.

Precauciones de uso: Pacientes que están en tratamiento con levodopa, esta debe suspenderse al menos doce horas antes de iniciar el tratamiento con levodopa carbidopa. Para reducir reacciones adversas, es necesario individualizar la terapia.
Todos los pacientes deben ser observados cuidadosamente para detectar el desarrollo de depresión con tendencias suicidas concomitantes.
Debe administrarse con precaución a pacientes con enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares graves, asma bronquial, enfermedad renal, hepática o endocrina.
Puede aumentar la posibilidad de problemas de hemorragia gastrointestinal superior en pacientes con antecedentes de úlcera péptica.

Solos o con otros fármacos dopaminérgicos han informado casos de sueño repentino y somnolencia.
Asociado a discinesias.
Se han informado alucinaciones y comportamiento psicótico con medicamentos dopaminérgicos.
Preguntar específicamente a los pacientes o a los cuidadores sobre el desarrollo de enfermedades nuevas o aumento de los impulsos de apostar, impulsos sexuales, gastos incontrolados u otros impulsos mientras recibe tratamiento.
Considerar reducir la dosis o suspender el medicamento si un paciente desarrolla tales impulsos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Administración concomitante de inhibidores no selectivos de la monoaminooxidasa o uso en los últimos 14 días.
Glaucoma de ángulo estrecho.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.