# Paracetamol (acetaminofén), supositorio 300 mg, vía rectal, código IGSS: 933

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Tratamiento sintomático ocasional del dolor de intensidad leve a moderado y estados febriles. Especialmente en pacientes en los que la administración por vía oral se halla dificultada.

**Reacciones adversas:** Erupción maculopapular pruriginosa, urticaria, malestar rectal, angioedema, aumento de bilirrubina, fosfatasa alcalina, nefrotoxicidad (sobredosis crónica), nefropatía analgésica, disminución de cloruro, glucosa, ácido úrico, edema laríngeo, agranulocitosis, disminución de bicarbonato, sodio, calcio, leucopenia, neutropenia, pancitopenia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, reacción anafilactoide, hipotensión, hipoglucemia, ictericia.

**Precauciones de uso:** No exceder la dosis recomendada, en niños menores de 3 años o en tratamientos prolongados, más de 3 días será, bajo criterio médico. Evitar tratamientos prolongados en pacientes con anemia afecciones cardíacas o pulmonares o con disfunción grave hepática y renal. Uso concomitante con anticonvulsivantes potenciación de hepatotoxicidad y se disminuye biodisponibilidad de paracetamol, especialmente en tratamientos con dosis altas. Evitar uso simultaneo con otros medicamentos que contengan paracetamol debido al riesgo de cuadros de intoxicación. En casos de diarrea el uso de supositorios no está recomendado.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a paracetamol o alguno de los excipientes.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.